



**ANNALES
DE
L'UNIVERSITE
MARIEN NGOUBI**

Sciences de la santé

VOL. 18 – N° 1 – ANNEE 2018

ISSN: 1815 – 4433

www.annalesumng.org

ANNALES DE L'UNIVERSITE MARIEN NGOUABI SCIENCES DE LA SANTE



VOLUME 18, NUMERO 1, ANNEE 2018

www.annalesumng.org

SOMMAIRE

Directeur de la publication :

J. R. IBARA

Rédacteur en chef :

J. GOMA-TCHIMBAKALA

Rédacteur en chef adjoint :

G. MONABEKA

Comité de Lecture :

B.I. ATIPO-IBARA (Brazzaville)
A. ATTIA KOFFI (Abidjan)
C. BOURAMOUE (Brazzaville)
C. GOMBE-MBALAWA (Brazzaville)
L. H. ILOKI (Brazzaville)
A. ITOUA NGAPORO (Brazzaville)
G. S. KIMBALY-KAKY (Brazzaville)
D. MOUKASSA (Brazzaville)
G. MOYEN (Brazzaville)
A. MOYIKOUA (Brazzaville)
H. TSIBA (Brazzaville)
G.A. OKIEMY (Brazzaville)
G. ONDZOTTO (Brazzaville)
A. POUYE (Dakar)
J. ZE MIKANDE (Kinshasa)

Comité de Rédaction :

A. ELIRA-DOCKEKIA (Brazzaville)
A. MBIKA CARDORELLE
(Brazzaville)
J. F. PEKO (Brazzaville)

Webmaster :

R. D. ANKY

Administration – Rédaction :

Université Marien NGOUABI
Direction de la Recherche
B.P. 69, Brazzaville – Congo
E-mail : annales@umng.cg

ISSN: 1815 - 4433

- 1 **URGENCES CHIRURGICALES NEONATALES
DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE
PEDIATRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER ET
UNIVERSITAIRE DE YOPOUGON**
*JEAN CLAUDE MIERET, GUY SERGE KOUAME YAPO,
JEAN BAPTISTE YAOKREH, ATAFI GAUDENS DIETH*

- 6 **MENSURATIONS DU CANAL LOMBAL DES
CONGOLAIS : ETUDE
RADIOMORPHOLOGIQUE DE 109 CAS**
*BOUKASSA L, MAVOUNGOU BIATI K, MASSAMBA
MIABAOU D, MAKOSSO E, EKOUELE MBAKI HB, KINATA
BAMBINO S, NGACKOSSO O.B, BILECKOT R.*

- 13 **LES TRAUMATISMES MAJEURS DU REIN :
ASPECTS DIAGNOSTIQUES ET
THERAPEUTIQUES AU CHU-GABRIEL TOURE
DE BAMAKO AU MALI**
*BERTHE HONORE J-G, KAMBOU DIEUDONNE, DIAKITE
MAMADOU LAMINE, ODZEBE ANANI S-W, SANGARE
DAOUDA, DIARRA ALKADRI, DIAKITE ADAMASALIFOU,
TEMBELY ALY, OUATTARA ZANAFON*

- 19 **PROFIL DES AFFECTIONS RESPIRATOIRES DU
SUJET AGÉ AU SERVICE DE PNEUMOLOGIE
DU CHU DE BRAZZAVILLE**
*BEMBA. E.L.P, OKEMBA-OKOMBI. F.H,
OSSIBI IBARA. B.R, BOPAKA. R. G, OSSALE ABACKA.K. B
ILLOYE-AYET.M, BINIAKOUNOU. J.B, ADJOH K S*

- 28 **LES AFFECTIONS RHUMATOLOGIQUES DE
L'ENFANT**
*N.E. LAMINI N'SOUNDHAT, D.C. NKOUALA-KIDEDE,
O.L.A. MOHONDIABEKA, O. AKOLI EKOYA, F.E.
OMBOUMAHOU BAKALE, A.P. SALEMO, H. NTSIBA*

**34 SPECIFICITES DE LA TUBERCULOSE DU SUJET
AGE AU CENTRE ANTITUBERCULEUX DE
BRAZZAVILLE**

*OKEMBA-OKOMBI. F.H, OSSIBI IBARA. B.R,
BEMBA. E.L.P, BOPAKA. R, OSSALE ABACKA.K. B,
ILLOYE-AYET.M, BINIAKOUNOU .J.B, ADJOH K S*



URGENCES CHIRURGICALES NEONATALES DANS LE SERVICE DE CHIRURGIE PEDIATRIQUE DU CENTRE HOSPITALIER ET UNIVERSITAIRE DE YOPOUGON

SURGICAL URGENCIES NEONATALES IN THE SERVICE OF SURGERY PÉDIATRIQUE AT THE UNIVERSITY HOSPITAL CENTER OF YOPOUGON

Jean Claude Mieret, Guy Serge Kouamé Yapo, Jean Baptiste Yaokreh, Atafi Gaudens Dieth

RESUME

Introduction : Les urgences chirurgicales néonatales dans les pays en voie de développement sont caractérisées par une mortalité élevée. Le but de cette étude était de recenser les urgences chirurgicales néonatales et d'analyser leur pronostic dans notre environnement.

Patients et méthode : Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur 96 dossiers de nouveau-nés hospitalisés sur une période de 4 ans (janvier 2010 à décembre 2014) pour une urgence chirurgicale opérée ou non. Nous avons étudié les aspects étiologiques, thérapeutiques et évolutifs.

Résultats : La fréquence des urgences chirurgicales néonatales était de 19,8%. Le délai moyen de consultation était de 6 jours extrême (1 et 14 jours). Les pathologies du tube digestif représentaient 58,3% (n=56) suivies des pathologies de la paroi abdominale antérieure dans 41,7% (n=40). Le délai thérapeutique moyen était 6 jours. Vingt-six (27,1%) nouveau-nés ont pu être opérés. Le taux de mortalité néonatale était de 58,2% (n=53). La mortalité préopératoire était de 49,4% (n=45) avec un délai moyen de 5 jours. La mortalité post opératoire était de 8,79% (n=8) avec un délai moyen de survenue de 5,2 jours. Les pathologies de la paroi abdominale étaient responsables de 54,7% (n=29) des décès.

Conclusion : Les urgences chirurgicales du nouveau-né sont caractérisées par un retard de prise en charge avec une mortalité élevée. L'amélioration de leur pronostic passe par un diagnostic précoce (diagnostic anténatal) et une prise en charge adéquate.

Mots-clés : mortalité ; nouveau-nés ; urgence chirurgicale

ABSTRACT

Introduction: Neonatal surgical diseases in developing countries are characterized by high rate of mortality. The aim of this study was to identify etiological aspects of the neonatal surgical diseases and analyze their prognosis

Patients and method: Medical records of 96 neonates aged 0 to 28 days who were hospitalized between January 2010 to December 2014 were studied retrospectively. Etiological aspects, therapeutic and outcome were recorded.

Results: Neonatal surgical disease frequency was 19.8%. The average time of admission was 6 days (range 1 to 14 days). Pathology of the gastrointestinal represented 58.3% (n = 56) followed by pathologies of the anterior abdominal wall in 41.7% (n = 40). The average treatment time was 6 days. Twenty-six (27.1%) newborns were treated surgically. The neonatal mortality rate was 58.2% (n = 53). The pre-operative mortality was 49.4% (n = 45) with a median time to onset of 5 days. Post-operative mortality was 8.79% (n = 8) with a median time to onset of 5.2 days.

Pathologies of the anterior abdominal were responsible for 54.7% (n=29) of deaths

Conclusion: Neonatal surgical are characterized by delay in management with a high mortality. Early diagnosis and adequate resuscitation can improve the prognosis.

Key words: mortality; newborn; surgical urgencies.

INTRODUCTION

Les urgences chirurgicales néonatales (UCN) sont les malformations congénitales ou acquises nécessitant une intervention chirurgicale dans un délai plus ou moins court [1]. Ces urgences sont caractérisées par une mortalité encore élevée de nos jours pour une pathologie souvent curable [2]. Si dans les pays développés, le dépistage anténatal et la prise en charge précoce ont permis de réduire le taux de mortalité de ces UCN de 50% à moins de 10% [1]. Dans les pays en voie de développement (PVD), la prise en charge se heurte à de nombreuses difficultés [3] liées au retard diagnostique et à l'insuffisance du plateau technique. Le but de cette étude était de recenser les UCN et d'analyser leur pronostic dans notre environnement.

PATIENTS ET METHODE

Il s'est agi d'une étude rétrospective à viser descriptive réalisée dans le service de chirurgie pédiatrique du Centre Hospitalier et Universitaire de Yopougon, entre janvier 2010 à décembre 2014 soit en 4 ans. Tous les nouveau-nés âgés de 0 à 28 jours hospitalisés pour une urgence chirurgicale engageant ou non le pronostic vital et dont les dossiers étaient exploitables ont constitués notre population d'étude. Pour chaque patient, les paramètres étudiés étaient : l'âge à l'admission, le lieu d'accouchement, les moyens d'évacuation, le délai de consultation, le poids à l'admission, le délai diagnostique, les différentes pathologies, le délai thérapeutique (défini comme étant le délai entre l'indication et l'acte chirurgical) et la mortalité.

RESULTATS

Sur les 950 hospitalisations durant la période d'étude, 96 cas d'UCN ont été retenus sur un total de 189 nouveaux nés. La fréquence des UCN était de 19,8%. Il s'agissait de 43 garçons et 53 filles (sex-ratio : 0,8). L'âge moyen à l'admission était de 7,53 jours extrêmes (1 et 28 jours). Quarante-cinq cas (47%) étaient nés dans une structure primaire, 19 cas (20%) dans une structure secondaire, 12 cas (12%) dans une structure tertiaire et 20 cas (21%) n'ont pas été précisés. Le poids moyen à l'admission était de 2181g extrêmes (1200 et 5100 g). Le délai moyen de consultation était de 6 jours extrême (24 heures et 14 jours). Le diagnostic des différentes pathologies a été posé soit à

partir de la structure référente, soit dans notre service avec un délai diagnostique moyen de 3 jours extrêmes (24 heures et 7 jours). Aucun diagnostic anténatal n'a été fait. Les pathologies du tube digestif représentaient 58,3% (n=56) suivies des pathologies de la paroi abdominale antérieure dans 41,7% (n=40). Ces différentes UCN étaient résumées dans le tableau 1. La prise en charge chirurgicale a concerné 26 nouveau-nés (27,1%). Le délai thérapeutique moyen était de 6 jours avec extrêmes (2 et 17 jours).

La mortalité globale dans notre série était de 53 cas (58,2%). La mortalité préopératoire était de 45 cas (49,4%). Ces décès avaient un délai moyen de 5 jours extrêmes (J1 à J13). La mortalité post opératoire était de 8 cas (8,79%) avec un délai moyen de survenue de 5,2 jours extrêmes (J1 et J13). Les pathologies de la paroi abdominales antérieures étaient responsables de 29 cas (54,7%) de décès. Ces décès étaient survenus dans un tableau d'anémie sévère, de déshydratation et dénutrition, d'infection, d'hypoglycémie, de choc septique. La distribution de la mortalité selon les pathologies était résumée dans le tableau 2.

DISCUSSION

La prise en charge des nouveau-nés présentant une urgence chirurgicale reste problématique dans les PVD où les moyens diagnostiques et thérapeutiques sont considérablement limités [4,5]. Ces difficultés sont à la base d'une mortalité néonatale préoccupante. Plusieurs études Africaines [6] en Guinée, [4] au Nigeria, [7] à Madagascar ont trouvé respectivement 29,28%, 30% et 40% des cas de décès. Les causes de cette lourde mortalité sont communes dans les PVD. Il s'agit du retard de consultation, du retard thérapeutique, de l'insuffisance du plateau technique, de l'absence de nutrition parentérale et d'unité de réanimation pédiatrique. Notre taux est semblable à celui de Dieth et al [8] pourrait trouver une explication dans la crise civilo-militaire. Si le diagnostic de certaines UCN nécessite un examen rigoureux d'autres comme la malformation ano-rectale, l'omphalocèle et le laparoschisis visibles en salle d'accouchement ne devraient pas bénéficier d'un retard de prise en charge. Dans notre série, l'âge moyen qui se révélait tardif à l'admission, est semblable à celui retrouvé par

Gbenou et al [9] au Bénin. Dans les PVD, les UCN sont caractérisées par un retard diagnostique qui pourrait s'expliquer par l'absence de diagnostic anténatal, la méconnaissance de ces pathologies dans les structures primaires et secondaires, l'automédication et les facteurs culturels (croyances et coutumes). Cela conduit à la dégradation de l'état général qui grève le pronostic vital. Contrairement, dans les pays développés le diagnostic anténatal permet un accouchement dans les structures adaptées et une prise en charge précoce [1].

Dans notre étude, les pathologies de la paroi abdominale antérieure étaient responsables de plus de la moitié des décès (54,7%). La rupture de l'omphalocèle, et le laparschisis, facteurs de mauvais pronostic rapporté par plusieurs auteurs études [4, 8, 10], entraînent une exposition des anses au milieu extérieur favorisant l'infection et l'hypothermie. Les pathologies digestives étaient responsables de 45,3% des décès et elles occupaient la deuxième position après les affections de la paroi abdominale antérieure. Les atrésies de l'œsophage constituent une cause fréquente de décès en période néonatale. Elles représentent 100% de décès comme le montre dans la série de Dieth [8]. C'est une affection qui nécessite une bonne réanimation pré et post opératoire. En effet, les nouveau-nés présentant une malformation ano-rectale ou une maladie de Hirschsprung étaient admis dans un tableau d'occlusion selon Ndour [10] et Keita [6].

La prise en charge chirurgicale de ces urgences doit s'accompagner d'une réanimation néonatale qui reste difficile dans les hôpitaux des PVD. Le retard à la chirurgie était rapporté par Takongmo et al [2] à Yaoundé qui ont observé 9 nouveaux nés opérés à 8 jours de vie sur une série de 13 patients. Le long délai thérapeutique pourrait s'expliquer dans notre contexte par le manque récurrent de produits sanguins, les difficultés d'achat des kits chirurgicaux en raison des contraintes financières des parents et les dysfonctionnements itératifs du bloc opératoire.

Conclusion

Les urgences chirurgicales néonatales sont relativement fréquentes dans notre étude. Elles

sont caractérisées par un retard diagnostique et de prise en charge, grevées d'une mortalité élevée dans les pays en voie de développement. L'amélioration du pronostic des urgences chirurgicales du nouveau-né passe par un diagnostic (diagnostic anténatal) et une prise en charge précoce, le plateau technique adéquat et la création d'unité de soins intensifs néonataux permettrait de réduire ce taux de mortalité.

REFERENCES

1. Banguy F, Baeudoin S. Urgences chirurgicales du nouveau-né et du nourrisson. *Encycl Med Chir Ped* 4-002-S-75 ;1999:10P
2. Takongmo S, Binam F, Monebenimp F, Simeu CH, Malonga EE. Les occlusions néonatales dans le service de chirurgie générale à Yaoundé (Cameroun). *Med Afrique Noire* 2000 ;47(3):153-6
3. Keita M, Magassouba DF. Les urgences chirurgicales néonatales dans le service chirurgie pédiatrique à propos de 96 observations. *Guinée Médical Conakry* n°34, 2001
4. Amed EA, Dogo PM, Nmadu PT. Emergency neonatal surgery in a developing country. *Country Pediatr surg Int* 2001;17:448-451
5. Ekenze SO, Ikechuk WURN, Oparaocha DC. Surgically correctable congenital anomalies: prospective analysis of management problems and outcome in a developing country. *Journal of tropical pediatrics* 2006;52(2):126-31
6. Keita M, Diallo MSA, Keita AK, Diallo AF, Balde I. Urgences chirurgicales néonatales dans le service de chirurgie pédiatrique CHU Donka. *Mali médical* 2006 ;4:16-20
7. Ralahy MF, Rakotoarivoni ST, Rakotovao MA, Hunaald FA, Rabenasolo M, Andriamanarivo ML. La mortalité néonatale au service des urgences du CHUA-JA Antananarivo-Madagascar. *Revue d'Anesth Réa et de Med d'Urgence* 2010 ;2(1):15-17
8. Dieth AG, Fiogbe M, Moh EN, Yaokreh JB, Tembely S, Dick R et al. La mortalité péri-opératoire en

- chirurgie viscérale chez l'enfant au CHU de Yopougon. Afrique Biomédicale 2008 ;13(2):28-33
9. Gbenou AS, Zoumenou E, Koura A, Fiogbe M, Hounnou GM, Agossou-Voyenne AK et al. Urgences chirurgicales néonatales digestives d'origine malformatives à l'hôpital Mère-enfant Lamel (Homel) à Cotonou. J Afr Fr Chir Ped 2008;0 (0):21-27
10. Ndour O, Faye FA, Alumeti D, Gueye K, Amadou I, Fall M et al. Facteurs de mortalité néonatale dans le service de chirurgie pédiatrique du CHU Aristide Le dantec de Dakar. Mali Médical 2009; Tome XXIV:n°1:33-38

Tableau 1 : Répartition des différentes pathologies

Pathologies	Effectif	Pourcentage (%)
Pathologies du tube digestif	56	58,3
Atrésie de l'œsophage	2	2,1
Sténose de pylore	2	2,1
Maladie de Hirschsprung	26	27,1
Péritonite néonatale	3	3,1
Atrésie du grêle	3	3,1
Malformation ano rectale	9	9,3
Occlusion néonatale	8	8,3
Hernie étranglée	3	3,1
Pathologies de la paroi abdominale antérieure	40	41,7
Omphalocèle rompue	4	4,2
Omphalocèle non rompue	32	33,3
Laparoschisis	4	4,2
Total	96	100

Tableau 2: Répartition de la mortalité selon la pathologie

Diagnostic	Effectif	Mortalité			Pourcentage (%)
		Pré op	Post op	Total	
Omphalocèle non rompue	32	21	0	21	65,6
Omphalocèle rompue	4	0	4	4	100
Maladie de Hirschsprung	26	11	0	11	42,3
Malformation ano-rectale	9	4	0	4	44,4
Occlusion néonatale	8	3	1	4	50
Péritonite néonatale	3	1	1	2	66,7
Laparoschisis	4	3	1	4	100
Atrésie œsophage	2	1	1	2	100
Atrésie iléale	3	1	0	1	33,3
Total	91	45	8	53	58,2